
DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

DIABETE.

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
DIABETE.

QUAM,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,
Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,
D. GEORGII BAIRD, S. S. T. P.
ACADEMIAE EDINBURGENAE PRAEFECTI;

NEC NON
Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu,
Et Nobilissimæ FACULTATIS MEDICAE Decreto;
PRO GRADU DOCTORIS,
SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT
JACOBUS VERNON,
JAIMACENSIS,
SOCIETATIS REG: PHYS. EDINEN. S. H.
NEC NON,
SOC. AMERIC. PHYSIC. EDINEN. SOC. EXTRAORD:

AD DIEM 24 JUNII, HORA LOCOQUE SOLITIS.

— *In a doubtful theme
Engag'd I wander through mysterious ways.*

ARMSTRONG.

EDINBURGI:
CUM PRIVILEGIO.
APUD ROBERTUM ALLAN.

M,DCC,XCVI.

350337

DISK T. F. O. A. B. I. S.
IN W. G. U. K. A. I. S.

D. I. A. B. E. T. E.

THE
LIBRARY

D. G. O. R. T. S. A. I. S. S. I. S.

THE

LIBRARY

OF

THE

UNIVERSITY




VIRO ILLUSTRISSIMO,
THOMÆ NASMYTH, M. D. S. P. D.

JACOBUS VERNON.

HANC occasionem, vir mihi in primis grate et acceptæ, opusculum hocce inaugurale tibi dicandi lubentissime arripio. Et cuinam alii præterea consecrari debet; namque, te duce et auspice, prima medicinæ elementa didici, et, in obscuris et perplexis, facem mihi præferre volens et amicus nunquam recusasti? Omnia bona et prospera, per totum vitæ decursum, tibi tuisque abunde contingant, et pro certo crede, me tuæ amicitiae stabilis et intemeratæ nunquam fore immemorem.—Vive vâleque.

Idibus Juniis, 1796, Edinburgi, dabam.



Digitized by the Internet Archive
in 2020 with funding from
Wellcome Library





DISSERTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

DIABETE.

JACOBO VERNON, AUCTORE.

HIC morbus antiquos non latuisse videtur. Non obscure a Celso depingitur. Quanquam hodie haudquaquam frequenter semet ostendit; olim tamen multo rarius fuisse videtur. Etenim duos ejus casus tantum vidit Galenus, quanquam,

A

multos

multos in annos, Romæ medicus fuit primarius. Complures auctores, e tempore Celsi, eum sunt executi. Quod vero notabile, nemo, ante Willifium, dulcedinis urinæ mentionem fecit. Cæterum ex quo hanc proprietatem monstravit, in plerisque ejus exemplis fuit notata.

DEFINITIO MORBI.

“ Urinæ præternaturalis, copia immodica, profusio chronica *.”

Duæ species idiopathicæ a nosologis diversis fuerunt enumeratæ.

1. “ Diabetes (Mellitus) cum urina odoris, coloris et saporis mellei.”

2. “ Diabetes

* Cullenii Gen. Morb. G. LXII.

2. “Diabetes insipidus, cum urina limpida, non dulci.”

Prior, ut supra fuit comprehensum, multo frequentius semet ostendit, et ea est, de qua potissimum verba faciemus. Posterior tam raro accedit, ut Cullenus celeberrimus, unam speciem idiopathicam tantum esse, existimare sibi in animum induxerit. Cum vero ipse postea unum ejus exemplum viderit, quod nulli alii morbo potuit referri; et quidam alii alia notaverint, eam retinendam judicavi.

HISTORIA.

Morbus plerumque gradatim accedit, et aliquamdiu subesse ante potest, quam ad eum attenditur. Quod signum primum notari consuevit, id plerumque est frequens urinam reddendi desiderium;

um ; et quantitas solita major excernitur. Quantitas urinæ et desiderium potus ex æquo incrementum. Os gradatim magis magisque arefcit, et faliva est albida, vifcida et fpumofa, et ad eam expuendam admodum pronus effe videtur ægrotus. Contra, vir illuftris, fide fumma digniffimus, mihi affirmavit, fe os humidum femper offendiffe, licet fitis, eodem tempore, non modica foret. Quæ urinæ quantitas excernitur, ea, fupra fidem, augeatur. Sitis, fub initia, modica. Auctus ejus profluvio urinæ, pro rata ratione, refpondet. Prout fitis intenditur, calor folito major in vifceribus abdominis percipitur, qui, morbo progrediente, ægrotum magnopere torquet, et doloribus ftipatur, qui femet ad regionem lumborum extendunt. Potestas urinæ, in fpatium temporis diuturnius, retinendæ, gradatim diminuitur, et fensus doloris ægrotum, ex intervallis breviffimis, eandem excernere fæpe cogit. Cutis arefcit, et fquamofa fit ; et ulcera, in partibus corporis diverfis, fuboriuntur, quæ fanatu difficillima funt, ad fanitatem reduci recentem mox excipiente. Alvus plerumque

que adstricta est ; et appetitus cibi solidi, qui, sub initia, permagnus est, prout morbus progreditur, decrescit, donec, ad extremum, alimentum omnigenum aversetur ægrotus. Nihilominus tamen magna inquietudo, in regione ventriculi, cum sensu esurie perpetuæ, percipitur. Vires gradatim diminuuntur, et notæ debilitatis sese manifeste ostendunt. Tumores œdematosi in partibus corporis diversis, ut in femoribus, cruribus et pedibus, noctem versus præsertim, apparent ; sed, mane appetente, rursus decedunt. Si ægrotus, in spatium temporis etiam brevius, excretionem urinæ cohibeat, tumores aliarum partium, ut lumborum, testium, &c. oriuntur, et semet diffundunt. Signa nonnunquam ascitæ in conspectum veniunt, adeo ut fluctuatio in cavo abdominis plane percipi possit. In quinque aut sex dies manet, et deinde gradatim decedit, et iterum, ex aliquo brevi intervallo, redit, morbum primarium vel idiopathicum nulla ex parte mutans. Volæ manuum plantæque pedum frequenter calescunt ; quod signum, noctem versus, augetur. Si sudor, quod quidem

raro incidere videtur, sub initium noctis, prorumpit, nonnunquam universus est, et odorem subacidum ingratum habet. Pulsus arteriarum octoginta vel nonaginta, intra minutum, plerumque non excedunt; sed, per hæcticos paroxysmos, qui fere semper, morbo provectiore, accedunt, multo frequentiores evadunt, centies et quindecies, vel centies et vigesies, singulis minutis, micantes. Corpus squalidum macrumque evadit, mens inquieta et mutabilis, cum aliquanto mœstitiæ, quod nullo modo depelli potest. Omnibus hisce signis increfcere pergentibus, convulsiones tandem accedunt, et mors miseriarum ægroti finem facit.

Signa aliquando, ab initio usque, violenter urgent, et ægrum, spatio quinque aut sex hebdomadarum, consumere possunt; plerumque vero tardissime progrediuntur, et morbus, in annos, producit, antequam ægrötum occidit.

Quantitas urinæ totum cibum potionemque plerumque excedit. Interdum tanta est, ut, pauculis diebus,

diebus, pondus totius corporis plus quam adæquet, adeo ut mors haud dubie ei inferretur, nisi hæc differentia ingesta inter et excreta, per aliquem fontem externum pensaretur, et nullum alium, præter absorptionem cutaneam, novimus.

Urina non tantum quantitate, sed etiam dotibus, præternaturalis est. Namque species diversas præ sese fert, sapore et odore admodum varia. In priore specie, vel diabete mellito, odorem et saporem subdulcem habet, et evaporata quantitatem materiæ saccharinæ præbere plerumque reperitur. Color ejus nonnunquam opacus est, et misturam mellis et aquæ dilutissimam refert. Plerumque tamen omnino pellucida est, et nonnihil flavæ viriditatis singularis exhibet, sub certa luce spectata. Servata nihil sedimenti plerumque ostendit. Aliquando pellicula in superficie formatur. Urina ægroti, qui, æstate anni 1794, curæ viri clarissimi Doctoris Gregory, in cubiculo clinico Nosocomii Regii Edinensis, semet mandaverat, sequentes dotibus habere reperiebatur. Novem ejus uncias, evaporationi

porationi subjectæ, unam materiæ saccharinæ constantiter edebant, quæ odorem omnino eundem, ac mel, habebat. Quod superfuit, in igne omnino confumebatur. Nullo cerevisiæ cremore ei adjuncto, fermentescebat, et liquores igitur spirituosi ex ea, per destillationem, eliciebantur. Nullam mutationem in colorem rubrorum et cæruleorum vegetabilium infusorum edebat. Vapores nullos alkali volatilis emittebat, calce viva, vel alkalinis fixis ei admistis. Gravitas ejus specifica aquæ propriæ, ut 1 : 0407, et urinæ sanæ, ut 1 : 0106, respondebat. Colorem usitatum habebat, sed prope modum odoris expers erat.

In specie altera, vel diabete insipido, nihil saporis dulcis habet, sed urinam communem vehementer redolet. Non saporis dulcis est, et forsitan, evaporata, nihil materiæ saccharinæ edit. Quod vero dolendum est, nulla experimenta in eam adhuc fuerunt instituta.

INCISIONES CADAVERUM.

Utilitatem harum, in lumine naturæ plerorumque morborum offundendo, magnam esse omnes hodie una voce confitentur; quanquam, quod magnopere dolendum, naturam diabetis parum hucusque illustrarunt. Petrus Parvius memoriæ prodit, renes puellæ, quæ hoc morbo, in aliquot annos, laboraverat, præter consuetudinem flaccidos, et colore cinereos, fuisse repertos, et fanos rubore non adæquasse. Quinetiam celeberrimus Hoffmannus exemplum posteris tradendum curavit, ubi, cadavere hominis, qui hoc morbo diu fuerat conflictatus, dissecto, concreta calcarea, in viis uriniferis inhærentia, fuerunt reperta; ubi dexter ureter magnopere dilatatus; ubi dexter ren insuper magnitudinem naturali et sana duplo majorem sibi fuerat adeptus. Reliqua abdominis viscera

quoque interdum morbo laborare reperiuntur, præsertim hepar. Hoc in causa esse videtur, cur Meadius celeberrimus, et plerique alii medici, exemplum ejus secuti, sedem hujusce morbi in hepate, non in renibus, esse posuerint. Vir ingeniosissimus, Doctor Myers, qui optimam hujus morbi historiam, quam adhuc offenderimus, tradit, incisionem cadaveris cujusdam, qui cum hoc morbo, longum in tempus, colluctatus, et tandem, in conclavi clinico, viro illustrissimo Doctore Home ægros curante, fuerat mortuus, accuratissime verbis sequentibus describit. “Renibus patefactis,” inquit ille, “sinister præter consuetudinem amplus, et substantia mollis. In duas partes æquales, ad lineam horizontalem, divisus, nihil fere pelvis, quæ ex toto propemodum fuit deleta, ostendit, et nihil amplius potuit videri, quam ureter certæ substantiæ ejus parti adjunctus. Tubuli uriniferi, quam sanitate substantive, multo minus evidentes et manifesti fuerunt. Dexter, eodem modo incisus, speciem magis sanam et naturalem præ sese tulit, et pelvis usitatam magnitudinem habuit. Ureteres

non, præter naturam, adaucti. Substantia utriusque renis odorem emisit subacidum. Omnes et mesenterii et mesocoli glandulæ intumuerant, colore pallidæ, substantia modice firmæ. Systema mesenterii sanguiferum aliquantum adauctum. Hepar specie sanum et naturale fuit, sed nonnullis in locis, colo firmiter adhæsit. Nulla lymphatica in vesica urinaria, quæ tunicis, præter consuetudinem, valida fuit, potuerunt notari. Reliqua abdominis et thoracis viscera omnes sanitatis notas habuerunt *.”

DIAGNOSIS.

Si omnes hujusce morbi æque, ac hæc, partes clare forent, morbis simplicissimis, quos noverimus, posset adnumerari. Urina, copia immodica, profusa, et fitis permagna ad hunc morbum a quo-

B 2

libet

* Vide Doctoris Myers Dissert. M. Inauguralem, Edin. anno 1779 editam.

libet alio fecernendum plane sufficiunt. Unicus quidem morbus, quocum confundi periclitatur, est urinæ incontinentia. Si vero notaverimus, quod desideria urinam reddendi, in diabete, licet frequentiora et manifeste morbida sint, animi imperio parent, sed, in urinæ incontinentia, ei obedire constanter recusant; nihil difficultatis omnino in illo ab hac distinguendo reperire valebimus.

CAUSÆ REMOTÆ.

Pleræque ex his, quæ ab auctoribus recensitæ fuerunt, tales sunt, quales debilitatem faciendo, et assimilationem alimenti diminuendo vel retardando, agunt. Quinetiam non pauculæ ex his, cursum humorum renes versus faciendo, effectus suos edunt, et, ut materia nutriens e corpore prius evacuetur, quam rite fuit concocta et assimilata, faciunt.

a.—Ufus liquidorum cujuslibet generis, ut theæ, liquorum spirituosorum, aquarum mineralium, &c. nimius ventriculum distensione, quam faciunt, debilitare potest. Duo priora vero præsertim ventriculo, quod neminem latet, potestate sua narcotica valentissima, vires, in modum in mirum, convellunt. Hoc modo concoctio et assimilatio lædi possunt, et experientia quotidiana evidentissime demonstrat, quantitatem urinæ nimis eorum, præsertim si calida fuerint, fumendo plurimum augeri.

b.—Evacuationes immodicæ. — Hujuscemodi sunt, profluvium urinæ, diureticis acerbis aliisque irritantibus, renibus admotis, factum; magnæ sanguinis detractiones, nimis feminis excretiones, &c. quæ, per magnam debilitatem, quam haud dubie progignunt, potestates assimilantes debilitare periclitantur. Igitur quantitas materiæ saccharinæ, præter consuetudinem, magna in systemate accumulabitur, renibus stimulo erit, excretionem urinæ augebit, et una cum ea præmature descendet.

c.—Defa-

c.—Defatigatio.—Compertum habemus, corpus, plerisque in exemplis, modica exercitatione corroborari. Si vero non citra defatigationem fit, eam debilitas et irritabilitas haud dubie excipient. Hinc, ob rationem modo positam, labor durus; cursus, equitatio et ambulatio nimia, diabetem movere periclitantur. Nec hoc mirandum est, si principia supra comprehensa respiciantur.

d.—Frigus.—Si corpori, in spatium temporis breve, et modice, applicetur, id universum corroborat, et circuitum humorum, in vasis cutis extremis, liberum promovet, ut rubor hujus evidenter ostendit. Si vero intensius fit, et, in tempus diuturnius, corpori admoveatur; vel si, a minore ad majorem gradum subito transeat, res longe aliter sese habet. Effectum sedantem plane edit. Quod cum incidit, actio vasorum cutis diminuitur, et, ob consensum magnum, qui eam inter et ventriculum intercedit, hic perturbari, et ita concoctio depravari et diminui periclitatur. Quinetiam,
ob

ob perspirationem cohibitam, impetum humorum renes versus adauget.

e.—Affectus animum contristantes.—Hujusmodi sunt metus, mœstitia, &c. quæ, ut neminem fugere potest, corpus plurimum debilitant, et organis concoctioni inservientibus potissimum nocent. Pallor quidem faciei, aliarumque corporis partium externarum, circuitum humorum ibi diminui plane evidenterque ostendit. Denique excretio urinæ adaucta, quæ affectus animi hoc genus nonnunquam comitatur, eos copiam humorum insolitam ad renes deducere, ultra omnem dubitationem, testatur.

Hæ sunt causæ præcipuæ, quæ, ut diabetis genitrices, fuerunt commemoratæ. Nonnihil vero amplius ad morbum excitandum necessarium esse videtur; namque eas omnes corpori, singulis diebus, admoveri, et nullum tamen effectum edere reperimus. Et plerumque quidem nullæ aliæ detegi possunt.

CAUSA PROXIMA.

Multæ opiniones diversæ, super natura hujusce morbi, posteris traditæ fuerunt ; nulla tamen earum ad omnia ejus phœnomena fatis lucide exponenda sufficit.

Joannes Dolæus, in sua Encyclopœdia Medica, unius, quæ a vi imaginandi sola potuit proficisci, et omnino improbabilis mentionem injicit. “ Tubulos,” ait ille, “ istos per omentum ex fundo stomachi prodeuntes nimis laxatos culpo ; per hos enim patentiores ductus, sine mora, pergit ad renes, quicquid est potulenti ; ad cor enim potus, in diabete, non potest deferri, quia impossibile est, potum per cor ita statim transire, et cum sanguine ad renes deferri, &c. *:

Quod

* P. 583 et seq.

Quod vero hanc opinionem ex toto convellit, est hoc, quod nulli ex anatomicis, quos hocce seculum viderit, accuratissimis ullos ex hisce tubis unquam videre valuerint. Et error omnino anilis est, opinari, potionem, ad renes usque, via cordis, æque cito eodemque tempore, non posse transire. Namque vasa lactea quemlibet liquorem, ventriculo receptum, æque cito, ac hi tubuli, abforberent, si revera existerent, et æque cito ad cor propellerent; adeo ut non tardius, vel propemodum æque celeriter, in vesicam uriniferam, deferretur, ac, per hosce tubulos, devehiri possit, et sanguinem, eodem fere momento, ingrederetur, sive hac, sive illa ratione proveheretur. Et, quod compertum habemus, sanguis totius corporis, spatio minutorum quinque, per utrumque ventriculum transire confuevit.

Eadem autem argumenta cum opinione, a juvene claro Carolo Darwin prolata, ex æquo pugnant.

Willisius celebris* memoriæ prodit, morbum a sanguine diffoluto, vel lymphâ coagulabili et crassamento non rite committis oriri. Cæterum partes, unde sanguis conflatur, nunquam a se invicem diffociantur, nisi lymphâ ipsâ coagulabilis, quæ omnes inter sese conjungat, et spissitudinem illis justam conciliet, sit dissoluta. Quod si incidit, nullam causam justam videre possum, cur humores non ex omnibus vasis, excernentibus æque, ac e renibus propriis, effundantur, ut in morbis, qui ad putredinem multum vergunt, incidere consuevit.

Junckerus ingeniosus actionem vasorum renum secernentium, admodum abnormem, pro causa hujusce morbi proxima habet, quæ, eo judice, ut non solum serum, sed etiam lymphâ, a pinguedine liquefacta deducta, in tubulos uriniferos, magno cum impetu, propellatur facit †. Quin actio vasorum renum secernentium abnormis moveatur, ambigi nequit. Hanc vero causam morbi solam non esse,

* Oper. tom. II. p. 90.

† Conspect. Med. p. 799.

esse, hinc evidentissime patet, quod sæpissime semet ostendit, verum diabetem idiopathicum minime procreans.

Listerus*, contra, morbum non ab ullo renum vitio, sed ab ardore ventriculi et intestinorum intenso, qui potiones, utcunque lenes sint, vi admodum diuretica acrique impertiri potest, oriri affirmat. Hanc opinionem vero ut refellamus minime necesse est; namque nulli alii fundamento, quam theoriæ meræ futilique, innititur. Et postea ostendemus, ardorem ventriculi et intestinorum non excretionem urinæ adauctam facere, sed ab eadem, ut merum effectum, recta proficisci.

Denique Boerhaavius† celeberrimus, qui facile pro lumine sui seculi præcipuo medico habebitur, diabetem nimix arteriarum renalium, quæ urinam fecernunt, laxitati et debilitati referri debere affirmat. Quinetiam huic humores dilutiores ad-

C 2

jungit.

* Exercit. Medic. p. 64.

† Prælect. Acad. tom. III. p. 174.

jungit. Prior causa quidem morbum aliquando gignere potest; sed nulla ratio subesse videtur, cur humores morbide tenues esse credamus. Namque urina, non raro, aliquamdiu servata, serum lacve dilutius, etiam nonnunquam, refert. Quod tantum abest, ut urinam solita tenuiorem, ut, contra, eandem, præter consuetudinem, crassam esse testetur.

Denique vir celeberrimus, Doctor Cullen, in prælectionibus suis practicis, causam hujusce morbi triplicem esse posse contendit.

1. Nimum sanguinis renes versus impetum.
2. Laxitatem vasorum renum fecernentium, præter consuetudinem, magnam.
3. Conditionem sanguinis certam, quæ, ut e renibus nimis copiose effundatur, facile potest facere.

Duas priores ad phenomena morbi explicanda minime sufficere jam vidimus. Igitur tantum opus est,

est, ut animum ad postremam considerandam adjungamus. Hanc revera incidere, minime potest negari. Vir celebris, Doctor Dobson, eam ab assimilatione imperfecta pendere probabile reddidit. Quo vero notitiam hujusce morbi naturæ claram habeamus, in quonam hæcce imperfectio consistat, sciamus oportet. Hoc vero omnino ignotum est, et ita restet oportet, donec plus luminis, quam in præsentia, argumento fuerit offusum.

EXPLICATIO PAUCULORUM E SIGNIS PRÆCIPUIS.

I. Quantitatis urinæ, quæ excernitur, magnæ. Hanc a nullo alio fonte, quam ab humoribus ipsis dissolutis, cum ingesta tantopere excedat, oriri posse multi sibi in animum induxerunt. In hoc vero, ex toto decipiuntur; namque nullæ notæ sunt in morbo reperiundæ, quæ humores colliquefactos esse probant. Immo, contra, urina calori,
qui

qui ut ebulliat facit, objecta minime cogitur*, quod nihil lymphæ coagulabilis ei inesse plane et evidenter ostendit. Namque hæc reliquarum sanguinis partium vinculum est; et, cum nihil hujus in urina diabetica reperiatur, reliquæ partes dissolvi nequeunt, sed per hujus præsentiam conjunctæ tenentur. Origo igitur unica, unde tanta urinæ quantitas derivari potest, est absorptio cutanea. Aer enim semper tanto humore repletur; ut magnæ ejus quantitates non absorberi non possint. Denique vis lymphaticorum cutis absorbens, hoc in morbo, multum intendi videtur.

2. Magnæ sitis, quantitatis salivæ exiguæ, caloris ventriculi et intestinorum, cutis ficcæ. Compertum autem habemus, una secretionem præter naturam adauctâ, reliquas, pro rata ratione, diminui solere. Jam vero vidimus, omnes causas, quæ diabetem movent, ad secretionem urinæ augendam plane conferre. Idcirco minime mirandum est, secretionem, in reliquis partibus, diminui. Unde omnia signa, supra comprehensa, recta profluunt;

et

et violentia eorum, ut experientia docet, quantitati urinæ excretæ, pro rata ratione, respondet.

3: Odoris fudoris subacidi. Cum tanta materiæ saccharinæ quantitas in sanguine contineatur, cumque hæc ad fermentationem omnigenam propclivis fit, et nonnihil hujus, etiam intra corpus, fortitan subeat, minime mirandum est, humores excretos odore subacido, fermentationis vinosæ progenie, esse imbutos. Si vero de fermentatione hujuscemodi, intra corpus, dubitetur, quidnam, quæso, obstat, quominus fudor, cum jam prorupit, vestimentis cohibitus, et ei calori, qui nunquam non in superficie corporis offendendus, obiectus fermentationem hic subeat, et sudorem subacidum, de quo agitur, progeneret?

4. Dotium urinæ præternaturalium: Hæ autem dulcedine et magna materiæ saccharinæ quantitate continentur. Illa ab hac evidentissime pendet. Nonnulla quidem sunt exempla, ubi dulcedo omnino deest. Hoc incidit, cum vires concoctri-

ces non multum debilitatæ sunt, et alimenta sumpta in chylum bonum nutrientemque converti pergunt. Cum vero potestates assimilantes magno-pere infractæ sunt, chylus non amplius rite concoquitur, et processus fermentationis, cui, intra corpus, objici videtur, non ultra stadium vinosum progreditur. Hinc materia saccharina, quæ alimentis, potissimum vegetabilibus, inest, utpote quæ corpori nutriendo infervire non diutius apta sit, in totum systema diffunditur, renibus stimulo est, et una cum urina descendit, hanc sapore dulci impertiens.

5. Tumorum, qui in partibus inferioribus semet ostendunt, hydropicorum, et corporis emaciati. Hæc signa autem adeo plana intellectuque facilia sunt, ut vix ullius explicationis indigere videantur. A debilitate originem plane deducunt, quæ nunquam in corpore, tanto urinæ profluvio laborante, et tantum materiæ saccharinæ, quæ ad id alendum a natura destinatur, singulis diebus, immo singulis momentis, perdente deesse potest. Et eadem quidem

quidem signa, sub finem omnium morborum ab infirmitate proficiscentium, semet ostendunt. Tumores hydropici in partibus inferioribus oriuntur, quod humores ibi, contra gravitatem suam, ascendant necesse est. Igitur difficilius propelluntur, et accumulari periclitantur.

P R O G N O S I S.

Eventus morbi faustus vix unquam tuto præfagiri potest. Per stadia maturiora, nonnunquam depulsus fuisse dicitur. Et exemplum ad notitiam meam nuper pervenit, ubi, pneumonia accedente, dulcedo urinæ sublata est; sed postea omnia signa, diabete propria, repetiverunt, et ægrotum extinxerunt. Et alia similia non defunt. Exempla vero nulla sunt, quibus fides debet haberi, ubi, postquam signa clare apparuerant, ex toto fuit curatus. Signa quidem aliquando tolluntur, sed mox redeunt,

cum usu medicamentorum desistitur. Nonnunquam omnia signa, ab initio usque, adeo urgent, ut, spatio quinque vel sex hebdomadarum, finiri possint. Aliis in exemplis, in complures annos, produci potest. Periculum, ne ægrotum cito rapiat, debilitati dotibusque urinæ, pro rata ratione, respondet. Quo magis hæc ingesta excedet, eo citius exitus funestus sperandus.

RATIO MEDENDI.

Consilia autem medendi idonea sequentia esse videntur.

I. Signa, quæ maxime urgent, levare.

II. Impetum humorum, renes versus factum, diminuere.

III.

III. Systema univcrsum corroborare, quoniam morbus non a debilitate renum folorum, fed totius corporis, pendere videtur.

I. Quæ signa levare præcipue debent, ea sunt macies corporis, fitis, durities alvi, &c.

Quantum ad maciem corporis attinet, ea ab affimilatione substantiarum et animalium et vegetabilium imperfecta pendere videtur. Ad eandem creandam quoque confert descensus, per renes, materiæ nutrientis præmaturus. Quo huic igitur occurratur, affimilationem conditioni naturali restituere, et, ne materia nutriens per renes evacuetur, cavere conandum est. Si posterius rite præstare possemus, maciei forsitan subveniretur. Quantum affimilationem imperfectam spectat, quod magnopere dolendum est, natura affimilationis imperfectæ tenebris spississimis involvitur; et igitur, quomodo ei obviam iri debeat, mortales ex toto ignorant.

Quantum ad duritiem alvinam attinet, ei optime

occurrent laxantia leniora, qualia sunt oleum simplex, vel, cum signum pertinax est, tinctura jalapii vel fenæ ei adjuncta, &c. Purgantia salina non in usum revocanda, quoniam excretionem per renes adaugent. Sitis denique restinguenda usu aurantiorum, vel tamarindorum, aut quorumlibet aliorum ascescentium, ægrotanti concessio.

Vir Clarissimus, qui nomen magnum in medicina sibi merito adeptus est, me certiore fecit, se carnem adiposam, butyrum et alias res oleosas, ad sitim restinguendam efficacissima omnium fuisse compertum.

II. Quæ remedia huic consilio respondent, ea sunt.

a. Diaphoretica.—Hæc in usu, in aliquantum temporis, communi fuerunt. Nonnulli potentissima diaphoretica, vel potius sudorifica, ut pulverem Doverianum, &c. in usum revocarunt. Cum vero tantam debilitatem faciant, in usu eorum

non diu potest perstari. Perspirationis liberæ promovendæ consilio tamen adhiberi possunt, quæ postea, vestimenta lanæ proxime cutem gerendo, conservanda est. Hoc modo impetus humorum cutem versus augeri, et renes versus diminui potest. Namque hoc verum esse omnes confitentur, unam secretionem augere esse aliam efficacissime diminueri.

b. Emetica.—Hæc, in morem diaphoreticorum, cursum humorem ad cutem augendo, et eundem ad renes minuendo, agunt. Propter actionis vero violentiam et magnam, quam faciunt, debilitatem, raro, aut nunquam, in usum tuto revocari possunt. Vomitionem vero utilem fuisse, ab exemplo a Doctore Myers adducto evidenter apparet. “ Exemplum vero,” inquit ille, “ ægroti memoriæ traditum est, qui vomitione adeo gravi, ut mortem ei intentaret, correptus est, qui que nihilominus e diabete ex toto, brevi, convaluit*.”

c. Balneum

* Vide Diss. Inaug. Edin. anno 1779, editam.

c. Balneum tepidum in regione calida.

Quantopere prius cutem relaxet, et quantum ad sudorem movendum conferat, neminem latere potest. Igitur eodem modo, quo medicamenta supra comprehensa, agit. Quantum ad regionem calidam attinet, pro specie quasi prioris habenda est; et operationem ei propriam conformem habet.

d. Exercitatio.—Hæc, modice adhibita, circuitum in vasis cutis extremis promovendo, vim tonicam in corpus exercendo, et animum ægrotantis morositia, quacum plerumque colluctatur, liberando, plurimum prodesse consuevit. Cum ægrotus plerumque admodum debilis sit, et defatigatio ei noceat, gestatio unica fere forma est, qua potest adhiberi, qualis est equitare, rheda vehere vel navigare. Hæc perspirationi amicissima esse, e duritie alvi et quantitate urinæ diminuta, quas faciunt, evidentissime patet.

e. Fricatio.—Hæc propemodum pro specie
exercitationis

exercitationis haberi potest. Circuitum in vasis cutaneis liberiores faciendo agit, et partem, cui applicatur, corroborat. Hoc exercitationi præstat, quod omnibus temporibus, omnibus locis, et ab omnibus hominum ordinibus, adhiberi potest.

f. Unctio—Corpus univèrsum oleo inungere multum prodesse fuit repertum. Illustrissimus Gregorius de casu meminit, ubi omnia signa, hac ratione, ex toto depulit. Morbus vero, intra paucos menses rediit, et ægrotus nosocomium revisit. Cum vero Doctorem non ibi reperisset, id ingredi noluit; sed domum repetivit, et, cum, in aliquantum temporis, languisset, diem supremum obiit. Magnæ absorptioni cutaneæ occurrendo, et ita impetum humorum ad renes diminuendo, agere videtur.

III.—Quæ remedia huic consilio conveniunt, ea subsequuntur.

a. Astringentia,—Hæc in solida simplicia agunt,

gunt, tonumque illis particulas, unde conflentur, ad se invicem propius accedere cogendo conciliant. Non parum auxilii, cum evacuationes ex aliis organis fecernentibus morbidas sæpe compefcant, hoc in morbo promittere videntur. Cæterum renes, reliquum systema roborando, tantum firmant; ea enim nunquam dari notiffimum est, quin effectus suos in totum corpus diffundant. Igitur hoc in morbo, qui minime renibus proprius est, sed systematis universi communis, esse videtur, in primis necessaria sunt. Eorum autem præcipua sunt acidum vitriolicum, aqua calcis, aqua Bathoniensis, et Bristolienfis, rhababarum, ut nonnullis placet, et alumen. Horum omnium periculum fieri potest; sed palmam reliquis præripit alumen. Vel substantia, vel forma feri aluminosi, adhiberi potest. Nunquam vero oblivifceris, hoc et reliqua adstringentia parum prodesse solere, nisi liberaliter assumantur, et in usu eorum fatis diu perstetur.

b. Tonica.—Plurima horum, hoc in vitio, fuerunt adhibita. Eodem modo, quo adstringentia, agunt.

agunt. Non tantum renes, sed canalem alimentarium, totumque systema, corroborant. Igitur nihil illis contra signa hujus morbi præcipua, concoctionem depravatam nempe, viresque assimilantes debilitatas, efficacius facile reperies. In modum autem astringentium, quam maxime liberaliter sunt adhibenda, alioquin parum proderunt. Præcipua ex hisce sunt cortex Peruvianus, præparata e ferro, amara, balneum frigidum, exercitatio, quam remediis cursum humorum ad superficiem facientibus supra annumeravimus.

c. Stimulantia.—Hæc, vasa languida et debilia excitando, tonum forsitan illis, et igitur universo corpori, aliqua ex parte conciliabunt. His haud dubie accensenda est tinctura cantharidum. Cum successu prospero adhibita fuisse dicitur. Votis vero ad eam nuper confugientium minime respondit, quantitatibus etiam largissimis adhibita.

Quædam alia medicamenta, ut utilia, commemorantur; sed modus, quo agunt, ex toto igno-

tus est. Hujuscemodi sunt gummi Arabicum, althæa, cornu cervinum, ichthyocolla, ostrea, &c. Haud dubie ex toto innocentia sunt, et ex toto quoque inutilia. Namque a multis plene tentata fuerunt, et nihil opis miserandis ægrotis attulerunt. Opium, vel per se datum, vel adstringentibus et tonicis adjunctum, et liberaliter adhibitum, magno opere profuit, et, nonnullis in exemplis, morbum omnino depulit.

Vir clarus, Carolus Keith, medicus Morpethensis, ut pro certo accepi, opium diabete laboranti, longum per tempus, liberaliter præscripsit, et quantitatem urinæ a libris septemdecim, quæ singulis diebus excernebantur, ad quinque, aut circiter, diminuit. Ægrotus in morbum non postea recidit, sed per pneumoniam, quæ morbo ita diminuto et levato supervenit, fuit raptus.

F I N I S.

